

## レジメン名：mFOLF0X 6+ベクティビックス

|        |      |
|--------|------|
| 診療科    | 外科   |
| 疾患     | 大腸癌  |
| インターバル | 2 週間 |

| 薬剤名          | 用量                    | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------|-----------------------|------|-------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|              |                       |      |       | 1   | 2 | ～ |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| ネオレスタール      | 10mg                  | 点滴   | 5 分   | ●   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| デカドロン<br>ナゼア | 6.6mg<br>0.3mg        | 点滴   | 15 分  | ●   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| ベクティビックス     | 6mg/Kg                | 点滴   | 1時間   | ●   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| エルプラット       | 85mg/m <sup>2</sup>   | 点滴   | 2 時間  | ●   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| アイソボリン       | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   |       |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 5－FU(急速)     | 400mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | 5 分   | ●   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 5－FU(持続)     | 2400mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | 46 時間 | ●   | → |   |  |  |  |  |  |  |  |    |

○必要に応じてアプレピタントカプセル 125mg 1C1 × (d1)、80mg 1C1 × (d2～3)追加可