

レジメン名：FP+Nivo 療法

診療科	外科
疾患	食道癌
インターバル	28 日

薬剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日									
				1	2	3	4	5	～				28
生理食塩液(フソー)	1L	点滴※1	8 時間 30 分	●									
フィジオ 140	500ml	点滴※1	3 時間	●									
硫酸 Mg 補正液(1Meq/ml)	20ml												
デカドロン注射液	3.3mg/1ml	点滴	30 分	●									
デカドロン注射液	6.6mg/2ml												
パロノセトロン点滴静注バック	0.75mg/50ml												
アロカリス点滴静注	235mg/10ml												
デカドロン注射液	6.6mg/2ml	点滴※2	30 分		●	●	●	●					
生理食塩液	100ml												
マンニトール注射液20%	300ml	点滴	2 時間 30 分	●									
オプジーボ点滴静注	480mg	点滴※3	30 分	●									
生理食塩液	50ml												
ランダ	80mg/m ²	点滴※4	2 時間	●									
テルモ生食	500ml												
ST3	500ml	点滴	3 時間		●	●	●	●					
5-FU	800mg/m ²	点滴	24 時間	●	●	●	●	●					
生理食塩液(フソー)	1L												

- ※1 同時に開始
 ※2 day 1 の前投薬と同じくらいの時間に投与するのが望ましい
 ※3 生食 24ml 抜き、全量 74ml にする インラインフィルター使用
 ※4 全量 500ml に調整