



【FOLFIRI療法について】

(5-FU+レボホリナート+カンプト)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デカドロン注 ナゼア注	吐き気止めです	15分																												
カンプト注	抗がん剤です	90分																												
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です	2時間																												
5-FU注	抗がん剤です	約5分																												
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間																												

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	食欲不振・吐き気																											
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
	口内炎																											
	下痢																											
	色素沈着																											
検査値	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																											
	白血球減少																											
	赤血球減少(貧血)																											
	血小板減少																											

- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

古河赤十字病院薬剤部