



【ビラフトビ+メクトビ+アービタックス療法について】



お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
デカドロン注	過敏症を抑える薬です	15分																													
ネオレスタール注		15分																													
アービタックス注	抗がん剤です	2時間→1時間		1回 カプセル								2回目から点滴時間が1時間になります。																			
生理食塩液	経過観察	1時間																													
ビラフトビカプセル	抗がん剤です	1日1回 内服																													
メクトビ錠	抗がん剤です	1日2回 内服																													

1回 カプセル

2回目から点滴時間が1時間になります。



治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	アレルギー様症状																											
	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																											
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																											
	にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。																											
検査値	食欲不振・吐き気																											
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
	下痢																											
検査値	電解質異常(マグネシウム低下など)																											
	肝機能低下																											

以下の副作用は、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 眼障害(虫が飛んでいるように見える、視力の低下、充血等) ●心機能障害(息苦しさ、息切れ) ●高血圧 ●出血(鼻血、血便、血尿、歯茎からの出血等)
- 皮膚悪性腫瘍(いぼができる、皮膚がただれる等) ●横紋筋融解症(筋肉痛や手足のしびれ、脱力感等)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。