# 【ロンサーフ+アバスチン療法について】

## お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

| 薬の名前 | 作用 | 目安の時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバスチン注 | 抗がん剤です | 90分 | 💉 | | | | | | | | | | | | | | 💉 | | | | | | | | | | | | | |
| ロンサーフ錠 | 抗がん剤です | 朝・夕　内服 | 💊 | 💊 | 💊 | 💊 | 💊 | 💊 | | 💊 | 💊 | 💊 | 💊 | 💊 | 💊 | | | | | | | | | | | | | | | |

2回目から点滴時間が短くなることがあります。

## 治療による副作用

：注意が必要な時期

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自覚症状 | 過敏症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 食欲不振・吐き気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 倦怠感 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便秘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色素沈着 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●血圧上昇　●出血（鼻血など）　●タンパク尿　●胃腸穿孔（下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など）　●傷の治りが遅い

●血栓・塞栓（足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど）

古河赤十字病院薬剤部