

ホルモン製剤（血栓リスク注意薬）

医薬品名	一般名	休薬期間の目安	添付文書上の記載	
ファボアール マーベロン	デソゲストレル エチニルエストラジオール	術前4週間 術後2週間	禁忌	
シンフェーズ	ノルエチステロン エチニルエストラジオール			
アンジュ トリキュラー ラベルフィーユ	レボノルゲストレル エチニルエストラジオール			
ルナベル配合 フリウェル配合	ノルエチステロン エチニルエストラジオール			
ヤーズ配合 ヤーズフレックス配合	ドロスピレン エチニルエストラジオール			
ジェミーナ配合	レボノルゲストレル エチニルエストラジオール			
プラバノール配合	ノルゲストレル エチニルエストラジオール			身体を動かせない状態は中止も考慮に入れる
メノエイドコンビパッチ	ノルエチステロン エストラジオール			施設によって見解は異なる 「休薬なし」 「術前4週間・術後2週間」 など
ウェールナラ配合	レボノルゲストレル エストラジオール	手術前4週間 長期臥床は慎重投与		
プレマリン	結合型エストロゲン	術前、長期臥床は慎重投与		
エストリール ホーリン	エストリオール			
ジュリナ ディビゲル ル・エストロジェル エストラーナテープ	エストラジオール			
ヒスロンH200	メドロキシプロゲステロン (高用量)	施設によって見解は異なる	術後1週間休薬	
エビスタ	ラロキシフェン	術前3日前中止、術後歩行開始により再開可能	長期不動状態になる3日前から歩行可能になるまで中止	
ビビアント	バゼドキシフェン		長期不動状態になる前から歩行可能になるまで中止	
ノルバデックス	タモキシフェン			

後発品使用の場合は『有効成分の一般的名称（一般名）＋剤形＋含量＋「会社名（屋号等）」』となりますので、「一般名」をご確認ください

参考資料

OC・LEPガイドライン2020（日本産婦人科学会2021年3月）

各製剤添付文書

古河赤十字病院 令和5年6月

OC：低用量経口避妊薬

LEP：子宮内膜症に伴う月経困難症治療に用いる低用量エストロゲン・プロゲステン配合薬